

J3 Erodierte Parabraunerde, Terra fusca-Parabraunerde, Pelosol-Parabraunerde, Pelosol-Braunerde und Terra fusca-Braunerde aus lösslehmreichen Fließerden über toniger Fließerde und Kalkstein des Oberen Muschelkalks
Verbreitet auftretende Böden

Bodenformgruppe	j-L09	
Flächenanteil	75–90 %	
Nutzung	LN, Wald	
Relief	ebene und schwach gewölbte Scheitelbereiche, Sattellagen und schwach bis mittel geneigte Hänge; vereinzelt stark geneigte bis steile Hangabschnitte	
Bodentyp	Parabraunerde, Terra fusca-Parabraunerde und Pelosol-Parabraunerde; Böden meist erodiert, mittel bis mäßig tief entwickelt und örtlich schwach pseudovergleyt; daneben mittel und mäßig tief entwickelte Pelosol-Braunerde und Terra fusca-Braunerde	
Ausgangsmaterial	lösslehmreiche Fließerden (Deck- und/oder Mittellage) über tonreicher Fließerde (Basislage) auf Karbonatgestein des Oberen Muschelkalks	
Bodenartenprofil	(Ut3–Tu3,Gr–fX0–1)	<5 dm
	Tu2–3,Gr–fX0–3(4)	4–10 dm
	Tu2,X4–6;^k:t;^k;(^m:t)	
Karbonatführung	meist unterhalb 4–9 dm u. Fl.	
Gründigkeit	mäßig tief bis tief, stellenweise mittel tief, Durchwurzelbarkeit nicht eingeschränkt	
Waldhumusform	typischer und moderartiger Mull bis mullartiger Moder	
Humusgehalt	Oberbod. LN	mittel humos
	Unterboden	stellenweise sehr schwach humos
Bodenreaktion	LN	sehr schwach sauer bis schwach sauer
	Wald	mittel sauer bis sehr stark sauer
Bodenschätzung	L4V, L5V, L4D, L5D, LT4V, LT5V, T5V, L4LöV, L4LöD, L5LöV, L5LöD, LIlb2	
Musterprofile	6623.3; 6623.12	

Begleitböden

untergeordnet flach und mittel tief entwickelte erodierte Parabraunerde und erodierte Terra fusca-Parabraunerde, karbonathaltig oberhalb 4 dm u. Fl. sowie tief entwickelte z. T. erodierte Parabraunerde und Terra fusca-Parabraunerde; vereinzelt Pseudogley-Parabraunerde, Terra fusca, Braunerde-Terra fusca, Pelosol, Braunerde-Pelosol, Pararendzina und Rendzina; in flachen Mulden und Hangfußlagen örtlich mittel und mäßig tiefes Kolluvium und Kolluvium über Parabraunerde

Kennwerte

Feldkapazität	mittel bis hoch (260–420 mm)
Nutzbare Feldkapazität	mittel bis hoch (90–160 mm)
Luftkapazität	mittel
Wasserdurchlässigkeit	mittel
Sorptionskapazität	mittel bis hoch (150–300 mol/z/m ²)
Erodierbarkeit	mittel bis hoch

Bodenfunktionen nach "Bodenschutz 23" (LUBW 2011)

Standort für naturnahe Vegetation	keine hohe oder sehr hohe Bewertung	
Natürliche Bodenfruchtbarkeit	mittel bis hoch (2.5)	
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf	LN: mittel bis hoch (2.5)	Wald: hoch bis sehr hoch (3.5)
Filter und Puffer für Schadstoffe	LN: hoch bis sehr hoch (3.5)	Wald: hoch bis sehr hoch (3.5)
Gesamtbewertung	LN: 2.83	Wald: 3.17

Verbreitung und Besonderheiten

verbreitete Kartiereinheit im Muschelkalkgebiet