





i14

Pararendzina, Pelosol-Pararendzina, Rendzina und Pelosol-Rendzina aus Dolomitstein- und Mergelsteinzersatz des Unteren Muschelkalks

Verbreitet auftretende Böden

| Bodenformgruppe | | i-Z07 | | |
|------------------|-------------|---|--------|--|
| Flächenanteil | | 60–70 % | | |
| Nutzung | | vorwiegend LN, untergeordnet Wald | | |
| Relief | | meist mittel, örtlich stark geneigte Hänge sowie flächenhafte Scheitelbereiche | | |
| Bodentyp | | Pararendzina, Pelosol-Pararendzina, Rendzina und Pelosol-Rendzina | | |
| Ausgangsmaterial | | Dolomit- und Mergelsteinzersatz des Unteren Muschelkalks (v. a. Mosbach-Subformation) | | |
| Bodenartenprofil | | Tu2-3(Ls2-Lu),Gr(fX)3-4 | 1–3 dm | |
| | | Tu2-3,Gr-fX5-6 | 2–5 dm | |
| | | ^d:u,l,t;^m:l,t | | |
| Karbonatführung | | karbonathaltig ab Bodenoberfläche | | |
| Gründigkeit | | flach bis mittel tief | | |
| Waldhumusform | | typischer und moderartiger Mull | | |
| Humusgehalt | Oberbod. LN | schwach humos bis mittel humos | | |
| | Unterboden | humusfrei | | |
| Bodenreaktion | LN | schwach alkalisch | | |
| | Wald | schwach alkalisch bis neutral | | |
| Bodenschätzung | | L6V, L5V, sL7V, sL6Vg, LT6V, LIIIb3, TIIIb5- | | |
| Musterprofile | | keine Angabe | | |
| | | | | |

Begleitböden

untergeordnet Pararendzina aus tonig-steiniger Muschelkalk-Fließerde (Basislage); selten, v. a. in konvexen Hangbereichen, Rendzina, Braune Rendzina, Terra fusca-Rendzina und Pelosol-Rendzina aus Zersatz des Unteren Muschelkalks sowie aus geringmächtiger steinig-toniger Muschelkalk-Fließerde (i-R04, Kartiereinheit i8); vereinzelt, in steileren Hangbereichen, Pararendzina aus Muschelkalk-Hangschutt

Kennwerte

| | - |
|------------------------|--|
| Feldkapazität | sehr gering bis gering (50–140 mm) |
| Nutzbare Feldkapazität | sehr gering bis gering (30–60 mm) |
| Luftkapazität | mittel |
| Wasserdurchlässigkeit | mittel |
| Sorptionskapazität | sehr gering bis gering (30–100 mol/z/m²) |
| Erodierbarkeit | sehr gering bis gering |

Bodenfunktionen nach "Bodenschutz 23" (LUBW 2011)

| Standort für naturnahe Vegetation | hoch | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Natürliche Bodenfruchtbarkeit | gering bis mittel (1.5) | | |
| Ausgleichskörper im Wasserkreislauf | LN: gering bis mittel (1.5) | Wald: mittel bis hoch (2.5) | |
| Filter und Puffer für Schadstoffe | LN: mittel (2.0) | Wald: mittel (2.0) | |
| Gesamtbewertung | LN: 1.67 | Wald: 2.00 | |

Verbreitung und Besonderheiten

häufige Kartiereinheit im südwestlichen Bauland zwischen Mosbach und Buchen